



TROUSSE D'URGENCE EN SOINS PALLIATIFS A DOMICILE

Date : Protocole validé en CA le 04/11/2004 et mis à jour le 11/09/2008

But :

Disposer immédiatement de médicaments ou matériel nécessaires dans un contexte d'urgence et adapté à la situation clinique du patient.

Procédure :

Rédiger une ordonnance d'anticipation.

- Les médicaments et matériels sont laissés au domicile du patient.
- Le médecin traitant rédige l'ordonnance. Le médecin coordonnateur du réseau peut être sollicité si nécessaire.
Le duplicata de la prescription indiquant la procédure d'utilisation est laissé dans le dossier du patient.
- En cas de prescription d'antalgique de palier 3. Elle comporte la mention en chevauchement de l'ordonnance du ...
- .L'existence de cette procédure doit être connue de l'entourage, des médecins, infirmiers intervenant, de l'équipe de coordination du réseau et de la permanence téléphonique du réseau.
- A la fin de la prise en charge, les produits ne restent pas en possession de l'entourage.

Produits (liste non exhaustive) :

Cocher chaque produit prescrit

- Chlorhydrate de Morphine® ampoule injectable à 10 mg/ml
- Chlorhydrate de Morphine® ampoule injectable à 50 mg/5ml
- Méthyl Prednisolone (Solumédrol®) flacon injectable à 20 mg 40 mg 120 mg
- Métoclopramide [Primpéran®] ampoule injectable

- Halopéridol (Haldol®) : Flacon de gouttes buvables à 2mg/ml ou ampoule injectable à 5 mg/ml
- Alprazolam (Xanax®) comprimés à 0,50 mg
- Bromhydrate de Scopolamine® ampoule injectable à 0,5 mg/2 ml
- Butylbromure de Scopolamine Scoburen® ampoule injectable à 20 mg/ 1 ml
- Midazolam (Hypnovel®) ampoule injectable à 5 mg/ ml Versed® ampoule injectable à 2 mg/ ml
- Clonazépam (Rivotril®) : gouttes buvables ampoule injectable IM
- Diazépam (Valium®) ampoules à 10 mg intra rectal
- Bloxang® Eponge hémostatique locale pour épistaxis (gélatine résorbable stérile) / Alginate de calcium Algostéril pour plaies hémorragiques

Laisser des exemplaires vierges d'ordonnance à prescription particulière

Dispositifs médicaux (liste non exhaustive) :

- Aiguilles épicroaniennes IM IV SC
- Seringues 1 ml 2 ml 5 ml 10 ml
- Sonde urinaire à demeure Set de pose et collecteur d'urine vidangeable
- Xylocaïne Lidocaïne gel à 2 % seringue pré-remplie à 10 g
- Chlorure de sodium poche 50 ml
- Kit de perfusion périphérique voie centrale Chambre implantable